

## 使用指導のポイント

前頁の質問から使用可能な方には、  
次のことを守って使用するように指導してください

- 成分・分量：有効成分 ペミロラストカリウム8mg  
添加物として、グリセリン、リン酸水素Na、リン酸二水素Na、ベンザルコニウム塩化物を含有します。
- 効能：花粉、ハウスダスト（室内塵）などによる次のような目のアレルギー症状の緩和：  
目の充血、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）、なみだ目、異物感（コロコロする感じ）

使用方法 使う前に手をきれいに洗ってください。



用法・用量 成人（15歳以上）及び7歳以上の小児：1回1滴、1日2回（朝、夕）点眼してください。

<用法・用量に関する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目の周囲に流れ出た液はすぐにふきとってください。
- (3) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。[汚染や異物混入（目やにやホコリなど）の原因となる] また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) 点眼用にのみ使用してください。
- (5) 用法・用量を厳守してください。
- (6) 花粉など季節性のアレルギーによる症状に使用する場合は、花粉飛散開始の1～2週間前から、又は花粉飛散期に入って症状が出始めたら、症状の軽い早めの時期からの使用が効果的です。
- (7) 1週間位使用しても症状がよくならない場合、また、症状の改善がみられても使用期間が2週間を超える場合は、医師又は薬剤師にご相談ください。

使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、添付文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤
目	充血、刺激感・しみる*、目やに、かゆみ*、痛み*

\*目のまわりを含む

花粉などによる目のアレルギー症状に

# ノアールPガード点眼液

## 適正使用のチェックシート

第1類医薬品

次の方には使用させないでください

- 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある方

## 上記にあてはまらない方

次の方の使用には注意し、  
場合によっては医師に相談するようご指導ください

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 医師の治療を受けている方              | <input type="checkbox"/> 眼球乾燥症候群（ドライアイ）の診断を受けた方、又はそのおそれのある方  |
| <input type="checkbox"/> 妊婦又は妊娠していると思われる方          | <input type="checkbox"/> コンタクトレンズを装用している方  |
| <input type="checkbox"/> 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある方  | <input type="checkbox"/> アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない方   |
| <input type="checkbox"/> 減感作療法など、アレルギーの治療を受けている方   | <input type="checkbox"/> とくに次のような場合はアレルギー以外の原因による症状の可能性があるため、使用前に医師又は薬剤師にご相談ください   |
| <input type="checkbox"/> アトピー性皮膚炎や喘息等のアレルギー体質をもつ小児 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・片方の目だけに症状がある場合</li> <li>・目の症状のみで、鼻には症状が見られない場合</li> <li>・視力が低下した場合</li> <li>・目やにの多い場合</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> 次の症状のある方                  |  |
|  | はげしい目の痛み、強い異物感   |

## 上記にあてはまらない方

ノアールPガード点眼液を使用できます。



花粉などによる目のアレルギー症状に

ノアールPガード点眼液

K1701学術ET®

（ご販売前に裏面の注意点をご説明ください）

## 使用上の注意と解説事項

「ノアールPガード点眼液」をご使用いただく際の使用上の注意と解説事項です。

お客様には下記の事項をよく読み、それを厳守した上で製品をご使用いただけます。

### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

#### 使用上の注意

#### 解説事項

##### 1. 次の人は使用しないでください

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人

有効成分と配合成分でアレルギー症状を起こすおそれがあり、注意が必要です。

(7) 眼球乾燥症候群(ドライアイ)の診断を受けた人又はそのおそれのある人

(8) コンタクトレンズを装用している人

(9) アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人。  
とくに次のような場合はアレルギー以外の原因による症状の可能性があるため、使用前に医師又は薬剤師にご相談ください  
・片方の目だけに症状がある場合  
・目の症状のみで、鼻には症状がみられない場合  
・視力が低下した場合  
・目やにの多い場合

眼球乾燥症候群(ドライアイ)とは、様々な要因による涙液および角結膜上皮の慢性疾患であり、眼不快感や視機能異常を伴うものです。コンピュータ作業を長時間継続的に行う方や高齢者等ではドライアイを併存する可能性が高いとされていますが、視力が低下した人や日常生活に支障がでる程の目のかわきを感じる方は眼球乾燥症候群の可能性がありますので、医療機関の受診をおすすめください。

コンタクトレンズの装用を希望する患者については、レンズ装用の可否について医師に相談する必要があります。

アレルギー以外の原因による症状に漫然と使用すると、他の疾患が隠蔽され、治療が遅れることがありますので、医療機関の受診をおすすめください。

### 相談すること

#### 使用上の注意

#### 解説事項

##### 1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください

(1) 医師の治療を受けている人。

医師から投薬又は処置を受けている場合があり、場合によっては成分の重複や相互作用を起こすおそれも考えられます。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

医療用ペミロラストカリウム点眼液の使用上の注意として、「妊娠又は妊娠している可能性のある婦人には治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。[妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。]」と記載されています。

(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

配合成分でアレルギー症状を起こすおそれがあり、注意が必要です。

(4) 減感作療法など、アレルギーの治療を受けている人。

同様の成分が投与されていたり、治療に影響を及ぼす可能性もあります。

(5) アトピー性皮膚炎や喘息等のアレルギー体質をもつ小児

小児は、「春季力タル」や「アトピー性角結膜炎」等の好発年齢にもあたり、アトピー性皮膚炎や喘息等の全身のアレルギー疾患の状態を把握することが重要ですので医療機関の受診をおすすめください。

(6) 次の症状のある人。  
はげしい目の痛み、強い異物感

急性緑内障、角膜潰瘍の疾患や外傷等による症状の場合は「はげしい目の痛み」が、春季力タルや眼感染症等の場合は結膜(主にまぶたの裏)に巨大な乳頭状の炎症が生じることにより「強い異物感」があり、これら疾患による症状は、医療機関を受診し、適切な処置を受ける必要があります。

##### 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、添付文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤
目	充血、刺激感・しみる*、 目やに、かゆみ*、痛み*

\*目のまわりを含む

人によっては、本品の使用によりこれらの症状があらわれることがあります。これらの症状があらわれたら、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してその指示を受ける必要があります。

##### 3. 次の場合は、使用を中止し、添付文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください

目のかすみが改善されない場合

緑内障、白内障、角膜障害、網膜症等、他の疾患が原因である可能性があります。

### 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- 他の人と共用しないでください。
- 使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。